



Sani-Bed

**Polvere pronta all'impiego ad uso esclusivamente
professionale**

**COMPLESSO MINERALE PER L'IGIENE DELLA LETTIERA
NEGLI ALLEVAMENTI BOVINI, OVI-CAPRINI, SUINI E POLLAME**

PRESENTAZIONE

- . Polvere, Biancastro
- . pH puro : Non disponibile
- . pH in sol. 10 g/l : $4,7\pm 0$
- . Densità a 20°C : $1,36\pm 0,05$ g/cm³
- . Punto di congelamento : Non disponibile

PROPRIETA'

Assorbente, acidificante e riduttore degli odori di ammoniaca

APPLICAZIONI

Polvere pronta all'impiego ad uso esclusivamente professionale
COMPLESSO MINERALE PER L'IGIENE DELLA LETTIERA NEGLI
ALLEVAMENTI BOVINI, OVI-CAPRINI, SUINI E POLLAME

Modo d'uso:

Spandere Sani-Bed in maniera omogenea sulle zone di riposo in ragione di :



SUINI: - Maternità :100 g/m² ogni 2 giorni sulle zone umide.

- Ingrasso: 100 g/m² alla settimana sulle zone umide.

POLLAME: 100 g/m² alla settimana a partire dalla terza settimana sulle zone di ricovero.

CONIGLI: gabbia madre: 10 g ogni 2 giorni fino a 2 settimane dopo il parto.

Deiezioni: 100 g/m² ogni 3 giorni.

BOVINI: LETTIERE PERMANENTI:

Dose d'attacco: 300 g/adulto ogni 2 giorni.

Dose di mantenimento : 200 g/adulto ogni 2 giorni ; 100 g/vitello ogni 2 giorni.

Ripetere la dose d' attacco 1 settimana al mese.

CUCLETTE: 100 g/vacca ogni 2 giorni (sul terzo posteriore della cuccetta).

OVINI-CAPRINI: 25 g/adulto ogni 2 giorni (raddoppiare la dose nel periodo del parto).

CONFEZIONI

Sacco 25l 25kg

SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza disponibile su internet :

<http://www.hypred.fr>

LEGISLAZIONE